

3-1

Cutaneous Bacterial Infections
أخماج الجلد الجرثومية

جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY

القوباء المعدية Impetigo contagiosum

المسبب : العقديات و/أو العنقوديات

الشكل السريري : فقاعة أو حويصل سطحي لا يصل للأدمة سريع التمزق ناز , ليترك قشرة عسلية (القوباء العسلية)

العلاج : B-lactam فمويّاً + موضعياً





الحمرة Erysipelas

- المسبب : العقديات Aالمفرزة للذيفان المحمر
- الشكل السريري : غالباً في الساق والوجه على شكل حمامى - وذمة - حرارة موضعية - ألم وهو يمتد ليصل للنسيج تحت الجلد .
- علاج : استشفاء (تسريب بنسلين G بجرعات عالية بعد اختبار التحسس ويعطي الماكروليد والكينولون حال التحسس على البنسلين)



أخماج الأظافر والأشعار :



• أولاً الداحس المقيح Paronychia

- المسبب : المذهبات
- الشكل السريري : وذمة في طية الظفر مؤلمة -
- حرارة موضعية - تجمع قيحي قد يتحول لخراج .
- العلاج : فموي او عضلي أو
- وريدي (حسب شدة الحالة) (Pencilline M - Cephalosporin 1/2) + تفريغ الخراج
- في حال تشكله + صادات موضعية .



ثانياً : التهاب الأجرية الشعرية Folliculitis

- التهاب الأجرية الشعرية السطحية Superficial Folliculitis
- المسبب : المذهبات
- الشكل السريري : بعد نزع الشعر (الذقن عند الرجال – الساقين عند النساء) تتظاهر ببثور سطحية مع هالة حمامية في مركزها سقبية الشعرة مع حكة وألم قليلين .
- العلاج : مطهرات موضعية + صادات موضعية + إجراءات حلقة صحية



Furuncle الدممل

- المسبب : المذهبات
- الشكل السريري : بثرة صغيرة محاطة بتورم جلدي محمر قاسٍ مؤلم حاك ، ثم يزداد التورم ليصبح قاتماً في المركز ويصل الدممل للنضج عندما يمتلئ بالقويح ويصبح متموجاً بالضغط ، ليفجر ويترك ندبة .
- العلاج : ايرثرومايسين – كلوكساسيلين بالطريق العام بعد تفجير الخراج باستثناء التوضعات الخاصة للخراج (الأنف والشفة العليا) .



Furuncles (boils) are tender nodules or pustules caused by *staphylococcal* infection. Carbuncles are clusters of furuncles that are subcutaneously connected.

Furuncle and Carbuncle



Carbuncle : Multiple pointing