الفصل الخامس

The fifth lecture

المحاضرة الثانية

الحموض النووية /2/

الكيمياء الحيوية
Biochemistry

1

مبادئ أولية في الكيمياء
الحيوية

2

الكربوهيدرات (السكريات)
الليبيدات (المواد الدسمة)

3

الأحماض الأمينية – الببتيدات البروتينات
– الأحماض النووية

4

جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY

النوكليوزيد	السكر	القاعدة
أدينوزين Adiosine ديوكسي أدينوزين 2- Deoxyadenosine	ريبوز ديوكسي ريبوز	أدينين
سيتيدين Cytidine ديوكسي سيتيدين 2- deoxycytidine	ريبوز ديوكسي ريبوز	سيتوزين
غوانوزين Guanosine ديوكسي غوانوزين 2- deoxyguanosine	ريبوز ديوكسي ريبوز	غوانين
ثيميدين Themidine ديوكسي ثيميدين 2- deoxythemidine	ريبوز ديوكسي ريبوز	ثيمين
يوريدين Uridie	ريبوز ديوكسي ريبوز	يوراسيل

النوكليوزيدات المشتقة من البيريميديينات تنتهي بالمقطع **osine**

النوكليوزيدات المشتقة من البورينات تنتهي بالمقطع **idine**

وجدت أربعة أنواع من الأسس الأزوتية وهي:

- الأسس البورينية: أدينين و غوانين

- الأسس البيريميدينية: ثيمين وسيتوزين

تركيب النكليوتيدات :Structure of nucleotides

وإنّ النكليوتيدات الموجودة في الحمض النووي هي غالباً النكليوتيدات التي يرتبط فيها الفوسفات مع مجموعة الهيدروكسيل في ذرة الكربون رقم 5'

أسماء النوكليوتيدات:

دي أوكسي ريبوز		الريبوز	
Deoxyadenosine 5- monophosphate dAMP	دي أوكسي أدينوزين-5- أحادي الفوسفات	Adenosine 5- monophosphate AMP	أدينوزين 5- أحادي الفوسفات
Deoxyguanosine 5- monophosphate dGMP	دي أوكسي غوانوزين-5- أحادي الفوسفات	Guanosine 5- monophosphate GMP	غوانوزين 5- أحادي الفوسفات
Deoxysytidine 5- monophosphate dCMP	دي أوكسي سيتيدين-5- أحادي الفوسفات	Sytidine 5- monophosphate CMP	سيتيدين 5- أحادي الفوسفات
Deoxyuridine 5- monophosphate dUMP	دي أوكسي يوردين-5- أحادي الفوسفات	Uridine 5- monophosphate UMP	يوردين 5- أحادي الفوسفات

أسماء النكليوتيدات:

نستنتج أنه في النوكليوتيد تتم إزالة مجموعة الفوسفات ووضع هيدروكسيل مكانها ليتحول إلى نوكلليوزيد

تواجد النكليوتيدات في الخلايا:

- ❖ وجد في الخلايا الطبيعية أنّ أعلى تركيز للنكليوتيدات هو نكليوتيد الأدينوزين ثلاثي الفوسفات ATP
- ❖ تتواجد النكليوتيدات الثنائية ADP بهيئة مساعدات إنزيمية
- ❖ وجد أنّ مستوى النكليوتيدات منقوصة الأكسجين يتعرّض لعدم استقرار أثناء دورة الخلية على عكس النكليوتيدات الريبوزية التي تبقى ثابتة نسبياً.

توضيح التفاعل:

- عندما يخسر ثلاثي الفوسفات ATP زمرة فوسفات ينتج عنه 10 كيلو كالوري ويتحول إلى ADP
- عندما يخسر ثنائي الفوسفات ADP زمرة فوسفات ينتج عنه 10 كيلو كالوري ويتحول إلى AMP
- عندما يخسر ثنائي الفوسفات AMP زمرة فوسفات ينتج عنه 2 كيلو كالوري ويتحول إلى أدينوزين
- عند تحول الـ ATP إلى أدينوزين فإنه يخسر 3 زمر فوسفات وينتج 22 كيلو كالوري

➤ تمثل النكليوتيدات المواد الأولية النشطة في بناء الأحماض النووية DNA و RNA

➤ تعد مشتقات النكليوتيدات مركبات وسطية نشطة في عدد كبير من عمليات البناء، مثل UDP-G (وهو المركب النشط في بناء الغليكوجين)

- يعد مركب الـ ATP عالي الطاقة ومهم في العديد من العمليات الحيوية
- يدخل نكليوتيد الأدينين في تركيب ثلاثة مرافقات إنزيمية وهي: (NAD, FAD, CoA)
- تملك جميع خلايا الكائنات الحية القدرة على بناء النكليوتيدات ماعدا بعض أنواع البكتيريا.
- يمكن للخلايا بناء النكليوتيدات البورينية والبيريميدينية من مواد أولية بسيطة مثل الأحماض الأمينية، ومعظمها له القدرة على إعادة استعمال الأسس البورينية والبيريميدينية القادمة مع الغذاء أو الناتجة عن تحطم الأحماض النووية.

الفرق الأساسي بين مساري بناء النكليوتيدات البورينية والبيريميدينية هو:

- ✓ تصنع النكليوتيدات البورينية مباشرة من المواد الأولية على هيئة نكليوتيدات، أي أنّ هيكل القاعدة البورينية يبني وهو مرتبط بجزء السكر الخماسي الريبوز
- ✓ أما في حالة النكليوتيدات البيريميدينية فإنّ القاعدة البيريميدينية تصنع أولاً، ثمّ تضاف إلى جزء السكر الخماسي الريبوز.

تحليل مكونات الـ DNA من الأسس الآزوتية Base Composition Analysis

- جاءت أهم المعلومات حول تركيب الحمض النووي منقوص الأكسجين من الاكتشاف الذي تمّ من قبل العالم شارغاف **Chargaff**
- وضّحت النتائج وجود **اختلافات واسعة في النسب المولية للأسس** الموجودة في الـ DNA **لأنواع مختلفة** على الرغم من كون الحموض النووية منقوصة الأكسجين الريبوزية في الأعضاء المختلفة والأنسجة لأي نوع تكون **أساساً نفسها**، سميت هذه العلاقة المتبادلة بقاعدة شارغاف.
- أوصلت المعلومات التي جمعت من عدد كبير من الأنواع المختلفة من الـ DNA شارغاف ومن ثمّ باحثين آخرين إلى النتائج الآتية:

- نماذج الـ DNA المعزولة **لنفس النوع** تمتلك **نفس المكونات من الأسس الآزوتية**
- تختلف مكونات الـ DNA من الأسس الآزوتية **من نوع لآخر**
- لا تتغير مكونات الـ DNA من الأسس لأي نوع بتغيّر: **الحالة الاستقلابية أو حالته الغذائية أو التغيرات في البيئة المحيطة**

- إن عدد وحدات الأدينين في جميع الحموض النووية منقوصة الأكسجين (لأي نوع) تكون مساوية لعدد وحدات التيمين بمعنى (T = A)
- إن عدد وحدات الغوانين في جميع الحموض النووية منقوصة الأكسجين (لأي نوع) تكون مساوية لعدد وحدات السيتوزين بمعنى (C = G)

من هذه العلاقة نجد أنّ مجموع وحدات البورينات يساوي مجموع البيريميديئات (T+C = A+G)
تسمى هذه بتكافؤ الأسس في الـ DNA (DNA Base equivalences)

في الرنا (RNA) يستبدل T بـ U

التركيب الأولي للأحماض النووية Primary Structure of Nucleic acids

- التعريف: هو تسلسل أو تعاقب النكليوتيدات، وهو الناتج من ارتباط النكليوتيدات الأحادية مع بعضها البعض بواسطة الرابطة الفوسفاتية بين ذرة الكربون رقم 3' من أحد النكليوتيدات والكربون 5' من النكليوتيدات التي تليها، لكل من DNA و RNA

- يمكن التمييز بين نهايتي السلسلة كما يلي:
- ✓ النهاية 5' تحمل مجموعة الفوسفات
- ✓ النهاية 3' تحمل مجموعة هيدروكسيل غير متفاعلة
- يعد التركيب الأولي لـ DNA مخزن المعلومات الوراثية

الجين Gene: عبارة عن تسلسل قطعة مفردة

التركيب الثانوي للـ DNA Primary Structure of DNA

تمّ التعرّف على التركيب الثانوي للـ DNA (نموذج التركيب الثلاثي الأبعاد للـ DNA) من قبل الباحثة **روزاليند فرانكلين** بداية عام (1952) ثم تابع كل من **واتسون وكريك** عام (1953)

دراسات فرانكلين: الدليل المباشر على تركيب الـ DNA

حيود أشعة X

بلورات DNA
عالي النقاوة

ما هو هذا
المفهوم

كيف تم الحصول
عليها

تحضير بلورات الـ DNA عالية النقاوة

استخدمت فرانكلين تقنية حيود أشعة X في الحصول على صور لبلورات من DNA عالي النقاوة

حيود الضوء عندما تسقط أشعة على جسم عائق تغير مسارها وأشعة X عبارة عن موجات ضوئية وبلورات الـ DNA شكلها منتظم بسبب كونها نقية

جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY

صورة حقيقية

نتائج الدراسات التي قامت بها روزاليند فرانكلين عن تركيب جزيء DNA

خارجية

داخلية

نشرت روزاليند فرانكلين عام 1952 صوراً لبلورات من DNA عالي النقاوة أوضحت فيها أن:

- 1- جزيء DNA ملف على شكل حلزون أو لولب بحيث تكون القواعد متعامدة على طول الخيط
- 2- هيكل سكر فوسفات يوجد في الجهة الخارجية للولب والقواعد النيتروجينية توجد جهة الداخل
- 3- القواعد النيتروجينية عمودية على الحلزون ويوجد أكثر من قطر على اللولب لذلك قالت أنه يوجد أكثر من لولب

نتائج الدراسات التي قامت بها روزاليند فرانكلين عن تركيب جزيء DNA

خارجية

داخلية

نموذج واطسون وكريك لتركيب الـ DNA

قواعد نيتروجينية

1- درجات السلم

2- جانبي السلم

3- يلتف النموذج على شكل لولبي

نموذج واتسون وكريك (B-DNA) The Watson – Crick Model

- يتكون هذا التركيب من سلسلتين حلزونيتين من النكليوتيدات المتعددة ملتفتين حول محور واحد لتكوين حلزون مزدوج double helix ويكون اتجاه الحلزون ناحية اليمين.
- يوجد في كل التفافه للحلزون عشرة أزواج من الأسس، وللحلزون المزدوج أخذودان أحدهما رئيسي والآخر ثانوي.
- السلسلتان غير متوازيتين بمعنى أن الجسر الفوسفاتي ثنائي الرابطة ($3' - 5'$) يسير باتجاهين متعاكسين.
- قواعد البورينات والبيريميدينات لكل سلسلة مرتبة إلى الداخل من الحلزون المزدوج وموازية للسلسلة الأخرى، كما أنها تكون عمودية على المحور الطولي للحلزون المزدوج.
- يستطيع كل زوج من الأسس أن يستدير بمقدار 36° نسبة إلى الزوج الذي يليه، وهكذا وجد أنّ كل لفة من الحلزون المزدوج يتسع لعشرة أزواج من الأسس.
- إنّ طول اللفة الكاملة للحلزون هي حوالي 3.4 نانومتر، والمسافة بين كل زوج من الأسس هي حوالي 0.34 نانومتر.

نموذج واتسون وكريك (B-DNA) The Watson – Crick Model

- يتم ازدواج الأسس للسلسلتين بحيث تكون بعض الأزواج من الأسس تتلاءم فقط داخل هذا التركيب، بحيث تؤدي إلى تكوين روابط هيدروجينية مع بعضها.
- الأزواج المسموح بتكوين روابط هيدروجينية مع بعضها البعض هي (A-T) و (C-G) وهي الملائمة للتماثل التام في الـ **DNA**.
- تقع الأسس غير المحبة للماء والقليلة الذوبان نسبياً إلى الداخل من الحلزون حيث تختبئ من الماء. أما وحدات السكر المحبة للماء ومجاميع الفوسفات المشحونة كهربائياً تقع على المحيط الخارجي وتكون معرضة للماء، هذا الشكل والترتيب يثبت الحلزون.
- ترتبط الأسس الأزوتية المتقابلة بين السلسلتين بروابط هيدروجينية حيث:
 - ترتبط **C** مع **G** بثلاث روابط هيدروجينية.
 - في حين ترتبط **A** مع **T** برابطتين هيدروجينيتين فقط

- يرتبط خيط الـ DNA مع بروتينات داعمة هي الهيستونات والبروتامينات.
- تتميز الهيستونات بكثرة الحموض الأمينية القاعدية (الليزين والأرجينين) ذات الشحنة الموجبة والأسس الأزوتية التي لها شحنة سالبة مما يسهل الارتباط بينها
- تتميز البروتامينات بوجود الحموض الأمينية الأساسية سالبة الشحنة (الاسبارتات + الغلوتامات) وهي داعمة لتكوين الكروماتين

بروتينات غير هيستونية Nonhistones

- يقصد بها كل البروتينات المرتبطة بالـ DNA فيما عدا الهيستونات.
- حامضية عادة.
- يوجد العديد من الأنواع المختلفة من هذه البروتينات.
- بعضها يؤدي دوراً مهماً في تركيب الكروموزوم وبعضها الآخر مهم في تنظيم التعبير الجيني.
- تختلف بشدة في العدد والنوع من نوع لآخر داخل الكائن الحي وفي الأوقات المختلفة في نفس الخلية ومن كائن لآخر.

**Nonhistones
Proteins**

**histones
Proteins**

جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY

أشكال حمض الـ RNA

الحمض النووي
الرايبوزي الناقل
tRNA

الحمض النووي
الرايبوزي الريبوزومي
rRNA

الحمض النووي
الرايبوزي الرسول
mRNA

أشكال حمض الـ RNA

1- الحمض النووي الريبوزي الرسول mRNA: يتم بنسخ جزء من إحدى سلسلتي حمض الـ **DNA** فتتكون نسخة على شريط قصير تسمى حمض **RNA** تكون مماثلة للجزء المنسوخ ولكن القواعد النيتروجينية تكون المكملة للموجودة على الجزء المنسوخ من **DNA** (**G** تقابل **C** و **A** تقابل **u**)

نسخة **RNA** المجهزة من الشيفرة داخل النواة، ترسل خارج النواة لذا تسمى حمض ريبوزي المرسل **mRNA** وهو الأقل تواجداً بين الأنواع الثلاثة للحمض النووي الريبوزي ووجوده مؤقت حتى تتم ترجمة الجين إلى بروتينات ثم يتحلل بعد ذلك

2- الحمض النووي الريبوزي الناقل tRNA الأشرطة القصيرة (نسخ **RNA** الموجودة في السيتوبلازم)

ويلاحظ أن كلاً منها يأخذ شكلاً له ثلاثة انتفاخات متصلة بروابط هيدروجينية (تسمى **كودون Codon** تحدد نوع الحمض الأميني الذي يجب أن ينقل إلى عضي الريبوزوم من بين **20 حمض**)

أشكال حمض الـ RNA

3- حمض الـ **RNA** الموجود في عضي الريبوزوم يسمى حمض ريبوزي ريبوزومي **rRNA** يقوم بربط الأحماض الأمينية التي أحضرها حمض **tRNA** وفق الشيفرة التي على حمض **mRNA**، فيتكون البروتين المطلوب بعد انتهاء عملية تكوين البروتين المطلوب، تنتهي علاقة حمض **mRNA** بالريبوزوم

RIBOSOME

أنواع الأحماض النووية:

دي أوكسي رايبونيوكلريك
(DNA) DeoxyRibonucleic Acid

الرايبونيوكلريك
(RNA) Ribonucleic Acid

RNA	DNA	
في السيتوبلازم أساساً	في النواة	الموقع
رايبوز	دي أوكسي رايبوز منقوص الأوكسجين	السكر الخماسي
(U) , (C)	(T) , (C)	البيريميدين
(G), (A)	(G) , (A)	البورين
طاق مفرد	طاق مزدوج نتيجة ارتباط القواعد النيتروجينية بروابط هيدروجينية	الشكل
RNase	DNase	الإنزيم المحلل مائياً
بناء بروتين	المادة الوراثية	دوره في الخلية
منخفض نسبياً	مرتفع جداً	الوزن الجزيئي

جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY

مقصورة

نطاق

نووي

إلى لقاء
قادم